



Compter les mélégèthes dans les parcelles de colza.

Situation stationnaire pour les blés et les orges.

Colza

Les colzas atteignent le stade boutons écartés à début floraison dans quelques parcelles.

Charançon de la tige

Le vol a redémarré la semaine dernière. La plupart des colzas ont atteint le stade tige 20 cm et ne sont plus sensibles à cet insecte.

Mélégèthes

Des captures importantes ont été observées dans certaines cuvettes.

Réaliser des comptages dans vos parcelles. N'intervenir que si les seuils sont atteints : ♦ 1 mélégèthe au stade boutons accolés ♦ 2 à 3 mélégèthes au stade boutons écartés. Ces seuils sont atteints dans quelques parcelles, notamment secteur de Lunéville.

Attention : Tout traitement devient inutile dès l'apparition des premières fleurs. Etant très attirés par la couleur jaune, les insectes se rassemblent sur les quelques fleurs présentes dans la parcelle. A ce stade, ils ne provoquent plus de dégâts sur boutons.

Maladies

Attendre le stade chute des premiers pétales pour intervenir.

Nouveau fongicide

COLUMBIA de la société SOPRA 150 g/l de fenpropidine + 100 g/l d'hexaconazole. Ce produit est autorisé sur ♦ oïdium et rouille de l'orge, ♦ oïdium, rouilles et septorioses du blé à la dose de 2,5 l/ha. Classement toxicologique : Xn (nocif).

Avis de la Protection des Végétaux : bon produit polyvalent à éviter toutefois en T1 si l'attaque de piétin verse est importante.

Céréales

Du fait des températures froides enregistrées cette semaine, la situation des céréales, tant au niveau phénologique que sanitaire, a peu évolué. Les premiers blés arrivent au stade 1 noeud, la plupart des orges sont encore entre épi 1 et 3 cm.

Le froid et l'humidité provoquant un dessèchement des gaines extérieures, les symptômes de piétin verse deviennent moins visibles. Leur passage sur les gaines sousjacentes risque d'être retardé, voire compromis.

Les maladies du feuillage, septoriose sur blé et rhynchosporiose sur orge, sont toujours localisées sur les feuilles de la base (F4 et F5 provisoires).

Nos préconisations de la dernière semaine restent valables, notamment pour le piétin verse. Tout traitement spécifique visant les maladies du feuillage est inutile.

Spécial Présept

Malgré les contaminations des 24 et 25 mars, le risque septoriose reste faible tant sur feuilles basses que hautes.

Agrément des distributeurs

de produits phytosanitaires et applicateurs prestataires de service. La loi n° 92.533 du 17 juin 1992 doit entrer en application le 1er janvier 1996. Actuellement rien ne peut être entrepris tant que les décrets d'application ne sont pas parus. Pas de panique.

77

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51



Tableau de synthèse des fongicides autorisés sur maladies du colza

Produit	Dose/ha	Cylindro	Pseudo	Sclerotinia	Alternaria
Calidan	3 l	B	B à TB	B à TB	B
Eria	2 l	-	TB	B à TB	B
Sportak PF	1,5 l	B	M à B	B	-
carbendazime	500 g	B	-	B à TB	-
Horizon EW	1 l	B à TB	B à TB	M	B à TB
Impact	1 l	B	TB	M à B	-
Impact R	1,25 l	B	TB	M à B	-
Yellow	1 l	B	TB	M à B	-
Konker	1,5 l	-	-	B à TB	-
Libéro	1,5 l	B	-	B à TB	-
Peltar	3 kg	-	-	M à B	-
Peltar Flo	5 l	-	-	M à B	-
Punch CS	0,8 l	B	B à TB	M	M
Alert	1 l	-	B à TB	M à B	*
Alto	0,8 l	*	*	-	-
Ronilan	1,5 kg ou l	-	-	B	-
Rovral		-	-	M (1,5 kg)	B (1 kg)
Kidan		-	-	M à B (3 l)	B (2 l)
Sportak 45	1,33 l	B	-	-	-
Sumisclex	1,5 kg	-	-	M à B	-
Sumisclex Liq		-	-	M à B (1 l)	B (1,5 l)
Polka	2 l	-	-	B	-
Troïka	1,5 l	*	*	M à B	-

M = Moyen

B = Bon

TB = Très Bon

* Pas d'avis

Un dépliant couleur

sur le pois est joint à ce bulletin.
Conservez-le !



